

SPISSLØNN *Acer platanoides* & PLATANLØNN *Acer pseudoplatanus*



Spisslønn i full blomst



Blomsterstand spisslønn

BLOMSTRING OG FRØSETTING

Lønn setter frø fra ca. 25 års alder. Trærne blomstrer på bar kvist i mai, samtidig med lauvsprett. Lønn har to-kjønnede blomster, men kan også ha enten hunn- eller hannblomster eller en kombinasjon. Befruktningen skjer ved insektbestøvning. Frøet er normalt modent i september – oktober og kan sankes til ut i november. Så snart fruktene blir brune faller de raskt til bakken og sanking bør skje før den tid. Lønn har årviss frøsetting og gode frøår med 1-2 års mellomrom.

artor-



Etter befruktning utvikles frukten raskt



Spisslønn "neser"



Foto: Øyvind Meland Edvardsen & Tore Molteberg

Blomsterstand platanlønn

REGISTRERING av frøsetting på våren skjer enklest ved å se etter de gulgrønne blomstene som under sterk blomstring sitter i små buketter over hele kronen. Spisslønn skiller seg ut fra all annen trevegetasjon under blomstringen med sin lysende fargeprakt.

Platanlønn blomstrer like etter lauvsprett og de hengende blomsterstandene er derfor mindre synlige enn hos spisslønn.



SKOGFRØVERKET

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk